

Medicinsko-biokemijski laboratorij

► Upute za određivanje tumorskih biljega

➔ Ukupni (tPSA) i slobodni (fPSA) prostata specifični antigen

☞ Uzorkovanje krvi potrebno je obaviti prije bilo kakve manipulacije i pregleda prostate.

☞ Potrebno je izbjegavati ejakulaciju najmanje 24 sata prije uzorkovanja krvi i vožnju bicikla 1 sat prije uzorkovanja krvi.

☞ Određivanje PSA treba odgoditi najmanje 6 tjedana nakon biopsije ili resekcije prostate te nakon antibiotske terapije infekcije mokraćnog sustava ili prostatitisa.

☞ Prilikom uzorkovanja krvi napomenuti uzimanje lijekova za bolesti prostate (Proscar, Avodart, Oksazosin, Tamsulosin i drugi).

➔ CA 125

☞ CA 125 ne smije se određivati za vrijeme menstruacije niti u prva dva tromjesečja trudnoće.

➔ Kromogranin A

☞ Važno je krv uzorkovati dok ste natašte.

☞ Uz dogovor s liječnikom, najmanje 2 tjedna prije uzimanja krvi izbjegavati lijekove iz skupine inhibitora protonske pumpe (npr. Acipán, Apazol, Ares, Cidiref, Controloc, Emanera, Lanzul, Larona, Naxesy, Nexium, Nolpaza, Ortanol, Pantoprazol, Pantozol, Ultop, Zipantola, Zoltex, Zolprax i drugi). Terapiju lijekovima iz skupine antagonista H2 receptora nije potrebno ukidati.