

Medicinsko-biokemijski laboratorij

► Upute za izvođenje testa intolerancije na histamin (D-HIT, DAO)

☞ Na uzorkovanje je potrebno doći **natašte**. 12 sati prije uzorkovanja krvi ne uzimati hranu. Dopušteno je piti vodu.

☞ Testiranje je najbolje provesti kada su prisutni simptomi koji upućuju na intoleranciju na histamin.

☞ Lijekove koji inhibiraju enzim diaminoksidazu ili uzrokuju oslobađanje endogenog histamina trebalo bi ukinuti prije uzorkovanja krvi, uz savjetovanje s liječnikom. Ukoliko nije moguće ukinuti terapiju, lijekove ponesite sa sobom i uzmite ih nakon uzorkovanja krvi.

☞ Popis lijekova koji inhibiraju enzim diaminooksidazu i lijekova koji uzrokuju oslobađanje endogenog histamina:

Lijekovi koji inhibiraju enzim diaminooksidazu (DAO)		
ANTIISTAMINICI	ANTIREUMATICI	ANTIMALARICI
Difenhidramin	Acemetacin	Klorokin
Cimetidin	ANTITUBERKULOTICI	ANTIBIOTICI
Prometazin	Izoniazid	Klavulanska kiselina
LIJEKOVI ZA ASTMU	BRONHODILATATORI	Izoniazid
Teofilin	Aminofilin	ANALGETICI
ANKSIOLITICI	ANTIEMETICI	Metamizol
Diazepam	Metoklopramid	Acetilsalicilna kiselina
NEUROLEPTICI	KARDIOTONICI	ANTIARITMICI
Haloperidol	Dobutamin	Propafenon
ANTIHIPERTENZIVI	DIURETICI	Kinidin
Hidralazin hidroklorid	Amilorid	PROKINETICI
Verapamil	Furosemid	Metoklopramid
Lijekovi koji uzrokuju oslobađanje endogenog histamina		
ANALGETICI	ANESTETICI	MUKOLITICI
Acetilsalicilna kiselina	Tiopental	Acetilcistein
Mefenaminska kiselina	CITOSTATICI	PROTUUPALNI LIJEKOVI
Diklofenak	Ciklofosamid	Naproksen
Indometacin	ANTITUSICI	MIŠIČNI RELAKSANSI
Ketoprofen	Kodein	Alkuronij

Poliklinika Borzan d.o.o.

Dubrovačka 12, Osijek

OIB: 92093246794

Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR1723600001102894235



POLIKLINIKA

•BORZAN•

ZNANJE • KVALITETA • SIGURNOST • VIZIJA

Tel. **031 218 691 • 091 44 777 23**

[www. poliklinika-borzan.hr](http://www.poliklinika-borzan.hr)

mail: info@poliklinika-borzan.hr